



**BADANIA  
PRENATALNE .PL**

info@badaniaprenatalne.pl

## Co to jest Chlamydia Trachomatis?

**Chlamydia trachomatis** jest bakterią, która uważana jest obecnie za jedną z głównych przyczyn dolegliwości układu moczowo-płciowego spowodowanych mikroorganizmami.

**i**

### **Czy Chlamydia trachomatis jest niebezpieczna?**

W ogromnym procencie przypadków, infekcja chlamydia trachomatis przebiega zupełnie bezobjawowo. Ponieważ nie odczuwasz żadnych niepokojących dolegliwości, nic nie skłania Cię do wizyty u lekarza i do wykonania odpowiednich badań. A to już z kolei, z uwagi na grożące Ci powikłania staje się sytuacją dosyć niebezpieczną.

### **1. Jakie objawy powinny nas zaniepokoić?**

Chlamydia trachomatis bardzo łatwo przenosi się drogą płciową. Uważa się nawet, że jest to najczęściej na świecie przekazywana drogą kontaktów seksualnych bakteria. Na zakażenie narażona

jest praktycznie każda osoba aktywna seksualnie, a zwłaszcza ludzie młodzi, którzy mieli kilku partnerów seksualnych oraz osoby, które wykazują zachowania seksualne wysokiego ryzyka. Badania dowodzą, że Chlamydia trachomatis zakażeni są najczęściej młodzi mężczyźni między 20, a 24 rokiem życia oraz dziewczęta i kobiety w wieku 16-19 lat.

Pamiętaj, że do zainfekowania bakterią może dojść również podczas stosunku oralnego, czy też analnego. Droga kontaktów seksualnych nie jest jednak jedyną możliwością zakażenia się bakterią. Infekcję „złapać” możemy bardzo łatwo na basenach i na różnego rodzaju otwartych kąpieliskach, a szczególnie tam, gdzie nie są surowo przestrzegane zasady higieny.

**Chlamydia trachomatis możesz zarazić się również korzystając z przedmiotów higieny osobistej osoby zainfekowanej, czy też z tej samej toalety!**

Warto wiedzieć, że Chlamydia trachomatis dostaje się do organizmu poprzez błonę śluzową oraz uszkodzoną skórę. Bardzo często uszkodzenia takie nie są nawet widoczne gołym okiem.





**BADANIA  
PRENATALNE**.PL

info@badaniaprenatalne.pl

## 2. Skąd będę wiedzieć, że jestem zakażona?

Pamiętaj, że w większości przypadków infekcja Chlamydia trachomatis przebiega bez żadnych widocznych objawów! Możesz być zakażony bakterią przez długi okres czasu, a co więcej – cały czas zakażać innych – zupełnie o tym nie wiedząc! Z uwagi na często bezobjawowy charakter infekcji, zakażenia Chlamydia w wielu przypadkach pozostają niezdiagnozowane. Możesz mieć także pewne objawy, które w większym lub mniejszym stopniu charakterystyczne są dla zakażenia Chlamydia trachomatis.

### **UWAŻAJ - Zwróć uwagę na objawy zakażenia!**

Pierwsze objawy infekcji mogą wystąpić już po około 7-14 dniach od momentu zakażenia. U kobiet zazwyczaj pojawia się zwiększona ilość wydzieliny z pochwy, krwawienie po stosunku, czy też ból w trakcie oddawaniu moczu.

U mężczyzn jednym z pierwszych objawów może być uczucie pieczenia w trakcie oddawania moczu. Są to jednakże pierwsze objawy, którą mogą, ale nie muszą się pojawić. Wydzielina

ropno-śluzowa z cewki moczowej, upławy, ból i pieczenie przy oddawaniu moczu, a także np. bóle podbrzusza, mogą wystąpić nawet po okresie 5 tygodni od momentu wniknięcia bakterii do organizmu.

## 3. Inne objawy zakażenia Chlamydia trachomatis:

- ◆ Częste, nawracające stany zapalne cewki moczowej
- ◆ Częste oddawanie moczu
- ◆ Zapalenia gruczołu krokowego
- ◆ Zapalenia jąder i najądrzy
- ◆ Zapalenia odbytnicy
- ◆ Nadżerki szyjki macicy
- ◆ Cysty w obrębie układu płciowego u kobiet
- ◆ Zapalenia gruczołów Bartholina
- ◆ Zapalenia jajowodów
- ◆ Bezpłodność
- ◆ Zapalenie okołowątrobowe
- ◆ Zapalenia ocznej, spojówek i/lub nietypowe zapalenie płuc u noworodków
- ◆ Zapalenia stawów
- ◆ Zapalenia gardzieli
- ◆ Zespół Reitera
- ◆ Nasiloną wydzielina z pochwy
- ◆ Ropniaki szyjki macicy



**BADANIA  
PRENATALNE .PL**

info@badaniaprenatalne.pl

**i**

Pamiętaj, że, mimo iż chlamydia traktowana jest jako choroba przenoszona drogą kontaktów seksualnych, objawy zakażenia pojawiają także w innych układach.

**Jeszcze raz podkreślimy, że bakteria może również przebywać w naszym organizmie przez wiele lat uśpiona, nie wywołując żadnego z wymienionych wyżej objawów.**

#### 4. Kiedy powinnaś się przebadać?

- ◆ Posiadasz, co najmniej jeden z wymienionych w poprzednim akapicie objawów (szczególnie przewlekłe, powtarzające się stany zapalne układu moczowo-płciowego)
- ◆ Przez dłuższy okres czasu, pomimo starania się o poczęcie, nie możesz zajść w ciążę
- ◆ Odczuwasz przewlekłe bóle narządów miednicy małej

- ◆ Masz krwawienia między miesiączkowe
- ◆ Odczuwasz ból w trakcie i/lub po stosunku
- ◆ Cierpisz na upławy

#### Do wykonania badań powinny Cię również skłonić następujące okoliczności:

- ◆ Jesteś młodą, aktywną seksualnie osobą
- ◆ Planujesz ciążę i chcesz mieć pewność, że Twojemu nowonarodzonemu dziecku nie będą groziły powikłania ze strony bakterii
- ◆ Jesteś kobietą stosującą doustną antykoncepcję hormonalną – u tej grupy kobiet odnotowano częstsze przypadki zakażenia chlamydialnego
- ◆ Masz niską odporność i często zapadasz na różnego rodzaju infekcje
- ◆ Cierpisz na astmę lub/i masz skłonność do alergii





**BADANIA  
PRENATALNE**.PL

info@badaniaprenatalne.pl

## 5. Diagnoza i co dalej?

Po zakończonym leczeniu infekcji Chlamydia trachomatis należy przeprowadzić test kontrolny, który potwierdzi skuteczność leczenia. W tym przypadku również najrozsądniej jest wybrać to badanie, które ma największą czułość i daje gwarancję na pewny wynik. Niestety, pozbycie się Chlamydii trachomatis wcale nie gwarantuje nam, że nie nastąpi nawrót zakażenia.

Co więcej, bardzo często po pewnym czasie od wyleczenia okazuje się, że charakterystyczne objawy infekcji powróciły. Przebyta i przeleczona infekcja bakterią nie daje nam, bowiem odporności na chlamydiozę.

## 6. Leczenie?

W leczeniu bakterii wykorzystuje się przede wszystkim antybiotyki. Zakażenia bakterią są często bardzo trudne do wyleczenia z uwagi na to, że Chlamydia trachomatis bywa

oporna na podawane leki. Nie zrażaj się! Nie każda kuracja przyniesie natychmiastowe skutki. Nie każde leczenie jest też skuteczne. Czasem trzeba metodą prób i błędów dobrać lek, nim ten w końcu zadziała. Najczęściej podaje się erytromycynę oraz azytromycynę. Kuracja antybiotykami może trwać wiele tygodni.

## 7. Gdzie szukać informacji



na bezpłatnej infolinii **800 007 771**  
pod numerem **(32) 445 34 26**



pod adresem e-mail **info@badaniaprenatalne.pl**



więcej informacji na temat badania bakterii  
Chlamydia Trachomatis jest dostępnych na stronie  
internetowej **www.testdna.pl**

