



**BADANIA
PRENATALNE**.PL

info@badaniaprenatalne.pl

Choroba zakrzepowo-zatorowa

Inne nazwy: zakrzepica, choroba zakrzepowa, trombofilia

Choroba zakrzepowo-zatorowa – jak sama nazwa wskazuje – to schorzenie związane **z zaburzeniami w krzepnięciu krwi**. W przebiegu tej choroby dochodzi do powstawania zakrzepów, które zamykają światła naczyń krwionośnych, co zaburza lub wręcz całkowicie uniemożliwia przepływ krwi w żyłach i tętnicach. Przyczyną choroby może być **mutacja czynnika krzepnięcia krwi – mutacja V Leiden, czy też mutacja protrombiny (czynnik II krzepnięcia krwi)**. Choroba zakrzepowo-zatorowa uważana jest za trzecią co do częstości występowania chorobę układu krwionośnego i główną przyczynę nagłych zgonów szpitalnych.

1. Głównymi objawami choroby zakrzepowo-zatorowej są;

- ◆ Obrzęki kończyn
- ◆ Bóle kończyn (spoczynkowe lub pod wpływem ucisku)
- ◆ Rozszerzenie naczyń skóra
- ◆ Zdarza się, że miejsca chorobowo zmienione zmieniają zabarwienie na sino-czerwone
- ◆ Dusznność, bóle w klatce piersiowej

i

Należy pamiętać o tym, że zakrzepica żył głębokich może rozwijać się zupełnie bezobjawowo, a przy tym stanowić stan bezpośredniego zagrożenia życia.





**BADANIA
PRENATALNE .PL**

info@badaniaprenatalne.pl

2. Jak wykryć genetyczne predyspozycje do zachorowania na zakrzepicę?

- ◆ Diagnostykę mutacji predysponujących do powstawania choroby zakrzepowo-żylnej umożliwiają **badania genetyczne**
- ◆ Istniejącą chorobę zakrzepowo-zatorową można zdiagnozować m.in. poprzez **badanie USG**

3. Leczenie zakrzepicy

- ◆ Leczenie przeciwzakrzepowe przy pomocy **leków**
- ◆ **Leczenie uciskowe** przy pomocy opasek i pończoch uciskowych stosowanych na kończyny
- ◆ Rozpuszczanie istniejących skrzepów
- ◆ **Leczenie operacyjne**





**BADANIA
PRENATALNE .PL**

info@badaniaprenatalne.pl

4. Kto powinien zrobić badanie w kierunku zakrzepicy:

- ◆ Pacjenci, u których występują objawy świadczące o możliwości wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej
- ◆ Pacjenci, których czekają zabiegi chirurgiczne związane z koniecznością długotrwałego unieruchomienia (np. zabiegi ortopedyczne)
- ◆ Osoby z przebytą zakrzepicą
- ◆ Pacjenci cierpiący na inne choroby zaburzające krzepliwość krwi
- ◆ Osoby stosujące antykoncepcję hormonalną lub hormonalną terapię zastępczą z uwagi na to, że stosowanie tych leków może prowokować powstawanie zakrzepów
- ◆ Kobiety, które poroniły ciążę
- ◆ Osoby cierpiące na choroby nowotworowe
- ◆ Osoby otyłe
- ◆ Osoby palące papierosy
- ◆ Osoby, które odbywają częste, długotrwałe podróże

5. Na czym polega badanie?

W badaniu wykonuje się **analizę mutacji genów** kodujących czynnik V oraz czynnik II (protrombinę) krzepnięcia krwi.

6. Gdzie szukać informacji



na bezpłatnej infolinii **800 007 771**
pod numerem **(32) 445 34 26**



pod adresem e-mail **info@badaniaprenatalne.pl**



więcej informacji o badaniu w kierunku celiakii
jest dostępnych na stronie internetowej
www.poradagenetyka.pl

